

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Μέσο: ΕΞΠΡΕΣ

Ημ. Έκδοσης: . . . 4/2/2012 Ημ. Αποδελτίωσης: . . 4/2/2012

Σελίδα: 39



Συνέδριο: Σε μία από τις μεγαλύτερες «απειλές» του σύγχρονου κόσμου αναδεικνύεται σήμερα ο σακχαρώδης διαβήτης. Η νόσος, που χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς «ύπουλη», καθώς τα πρώτα χρόνια μπορεί να δρα κρυφά χωρίς να εκδηλώνει συμπτώματα, αποτελεί το γενεσιουργό αίτιο εμφάνισης πολλών άλλων σοβαρών παθήσεων με βαριές επιπλοκές. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία από τις συχνότερες επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη, το διαβητικό πόδι, ευθύνεται για τον ακρωτηριασμό των κάτω άκρων κάποιου συνανθρώπου μας κάθε 30 δευτερόλεπτα σε παγκόσμιο επίπεδο! Οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν στον ακρωτηριασμό είναι τα έλκη των κάτω άκρων. Υπολογίζεται ότι το 25% των ατόμων με διαβήτη θα εμφανίσει έλκος στα κάτω άκρα έστω μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του. Στατιστικά, 1.000.000 άτομα με σακχαρώδη διαβήτη αναγκάζονται να υποβληθούν σε ακρωτηριασμό ενός άκρου τους σε ετήσια βάση. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (ΕΜΕΔΙΠ), με στόχο την έγκυρη επιστημονική ενημέρωση για την αντιμετώπιση της «μάστιγας» των ακρωτηριασμών των διαβητικών ασθενών σε διεθνές επίπεδο, διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή στις 9 - 11 Φεβρουαρίου στην Αθήνα (Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL).